

የኤም ኤል ኤን በሽታን በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ ለመቆጣጠር እንዲቻል የሚወሰዱ አስራ ሁለቱ እርምጃዎች

ኤም ኤል ኤን በሽታ ምንድን ነው?

- ኤም ኤል ኤን በሽታ በቆሎን የሚያጠቃ የቫይረስ በሽታ ነው።
- የኤም ኤል ኤን በሽታ መንስኤ የሚሸ ክሎሪቲክ ሞታል ቫይረስ ከሌላ ቫይረስ ለምሳሌ ሹገርኬን ሞዛይክ ቫይረስ ፣ሚዝ ዱዋርፍ ሞዛይክ ቫይረስ ፣ወይንም ከዊት ስትሪክ ሞዛይክ ቫይረስ በጋራ የሚከሰት በሽታ ነው።
- በአፍሪካ በሽታዉ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪፖርት የተደረገዉ በመስከረም 2011 በኬኒያ ሲሆን ከዚያም በታንዛኒያ፣ኡጋንዳ፣ሩዋንዳ፣ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፣በደቡብ ሱዳን እና በኢትዮጵያ በ2014 ተከስቷል።
- የኤም ኤል ኤን በሽታ ለበቆሎ አመራረት ከፍተኛ ተግዳሮት ያለዉና መቶ ፐርሰንት የምርት ብክነትን ስለሚያስከትል ለምስራቅ አፍሪካ የምግብ ዋስትና ስጋት ነው።


የኤም ኤል ኤን በሽታ ምልክቶች እና የመተላለፊያ መንገዶች

የኤም ኤል ኤን በሽታ ምልክቶች:



ቅጠሎቹ በከፍተኛ ሁኔታ መጎዳት በበሽታዉ የተጠቁ የበቆሎ ቅጠሎች የክሎሮስ ወይንም ኒክሮሲስ ሊኖራቸዉ ይችላል

መካንነት ወይንም የአበባ ዱቄት አለማምረት



በጣም አናሳ ወይንም ምንም የበቆሎ ፍሬ አለመያዝ

የበቆሎዉ ልባስ ያለጊዜዉ መድረቅ



ግንዱ(ቅጠል የሚወጣበት የተክሉ ክፍል) ማጠር ፤ ድንክ መሆን

የበቆሎ ፍሬ የመሞት ምልክት (የኒክሮሲስ ቅጠሎች ፤ ማዕከላዊ ክፍል መመንመንና መድረቅ)



የኤም ኤን ኤል በሽታ እንዴት ይዛመታ ?

ነፍሳቶች(ተሽካሚ ነፍሳት) የኤም ኤን ኤል ቫይረስን ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ከእነዚህም መካከል (ትሪፕስ፣ አፊድስ፣ጢንዚዛዎን እና የስራስር ትሎች) ይገኙበታል።



ትሪፕስ

አፊድስ

የኤም ኤን ኤል በሽታ ዘር ወለድም ሊሆን ይችላል(ማለትም ከተበከለ ተክል የተገኘ ዘር በዉስጡ ቫይረሱን ሊይዝ ይችላል።




እንስሳት ፣ሰዎች ፣ የእርሻ መገልገያ ማሽኖዎችና ቁሳቁሶች ከተበከለ የእርሻ መሬት ወደሌላኛዉ በእንቅስቃሴ ወቅት ለያስራጩ እና የብክለት ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ።



የኤም ኤል ኤን በሽታ እንዳይሰራጭ አርሶ አደሮች እንዴት መከላከል ይችላሉ?

አርሶ አደሮች የሚከተሉትን አስራ ሁለት እርምጃዎች በመከተል የበሽታውን ስርጭት ማስቀረት ይችላሉ

1. መሬቱን ከመዝራት በፊት የመሬቱን የአስተራረስ እና የበሽታ ታሪክ ማጥናት፡፡ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ አፈራርቆ መዝራት፡፡



8. የበሽታ አሳተላላፊ ነፋሳት በማሳወቅ መከላከል፡፡ የነፍሳቶች በብዛት መገኘት በበሽታ የመጠቃት አድልን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል፡፡



2. የእርሻ መሬቱ ላይ ያለው አፈር ሁሉም ለም መሆኑን ማረጋገጥ፡፡ ይህም አዝርዕቱ ጤናማ እንዲሆንና በሽታን እንዲቋቋሙ ይረዳቸዋል፡፡



9. የሚመከሩ የተባይ ማጥፊያዎችን በመጠቀም የበሽታ አምጭ ነፍሳትን በኬሚካል መቆጣጠር እንደሚቻል ያስታውሱ (በሳምንት ወይም በሁለት ሳምንት አንዴ ይጠቀሙ)



3. ሁሉም ማረጋገጫ የተሰጠውን ዘር መጠቀም፡፡ ዘርንም በተደጋጋሚ አለመጠቀም፡፡



10. የኤም ኤል ኤን በሽታ ምልክቶችን መከታተል ቶሎ ሁኔታውን ተገንዝቦ መፍትሄ ለመፈለግ ይረዳል፡፡




4. እህልን እንደ ዘር አለመጠቀም፡፡



5. ማንኛውንም የእርሻ መሳሪያ ከተጠቀሙ በኋላ በአግባቡ ማጽዳት የበሽታው አምጭ ቫይረስን መዛመት ያስቀራል፡፡



6. ዝናብ መዝነብ እንደጀመረ ቀድሞ መዝራት፡፡



7. ሳርና አረም ለቫይረሱ እንዲሁም ለበሽታ አስተላላፊ ነፍሳት መደበቂያ ሊሆኑ የሚችሉ ስለሚችሉ በአየራዊው በማስወገድ የማሳወን ጽዳት መጠበቅ፡፡



11. የኤም ኤል ኤን ምልክት የታየባቸውን ተክሎች በቶሎ በመንቀልና ከማሳወ ወጭ ማቃጠል ወይም መቅበር የበሽታውን ስርጭት ለመቀነስ ይረዳል፡፡ በኤም ኤል ኤን የተጠቃ ተክልም ሆነ የግጦች መሬት እንስሳት እንዳይጠቀሙ ማድረግ ፡፡



የጥራ ጥሬ ሰብሎችን (ባቄላ፣አኩሪ አተር ፣ አተር) በማብቀል በማፈራረቅ መዝራት፡፡ በተደጋጋሚ በቆሎን አለመዝራትና ያለበቆሎ ቢያንስ ሁለት ወራት የሚቆይበትን የአስራር ሁኔታ ማመቻቸት፡፡

